

醫

學

一

見

能

醫學一見能敝

備豫不虞古之善教而不虞之備莫要於醫高堂則風竹瓦霜  
膝下則新雛弱筍外而戚友中則己身偶有疾苦均資乎醫誠  
重矣哉顧醫之難也非讀書識字則不能醫非格物窮理則不  
能醫非通權達變更不能醫一旦櫻非常之疾束手無策只得  
委任凡醫聽其措置為之醫者又復混亂陰陽顛倒寒熱投劑  
不中至於垂危明哲之士鑒前車思補救奮然求濟於方書而  
諸書率皆大海茫茫渺無涯涘深則摘要鉤元淺則捕風捉影  
倉皇檢閱兩俱無益病家既窮於醫又窮於書惟撫膺扼腕有

恨其不能醫已耳噫醫固如是之難能已乎抑亦所見之書有  
未遽能者乎夫紀昌之射六載方工伯牙之琴三年未妙天下  
事安有一見而能者哉顧事之在所緩者不必求諸一見而事  
之在所急者要無取乎難能況不測之來危在頃刻非開卷了  
然之書何以供家俗急時之用余因感此集為是書即不知醫  
家臨證查對無不瞭如指掌且是書也雖非鉤元摘要之微亦  
匪捉影捕風之陋果能洞書中之言通言外之意將淺者見淺  
深者見深而吾一見能之裨於世用也詎有涯哉時

同治癸酉秋九四川彭縣容川唐宗海自題

# 凡例

一他書皆標證名是書原為不知醫者而設標出證名轉生迷眩故見某病苦即收入某門以便查閱

一是書首句是病案次句是病情三句是病判有見某病案得某病情然後可判為某病者有見某病案不得某病情而亦可判為某病者文法自有輕重之分又有首句是情次句是案者文法之變也

一是書雖簡畧然每遇一證必究其源審知陰陽分別臟腑即見病治病比時書却高一格

一丸湯飲散煮法服法以隘於筆楮不及備載大約行血用酒滋補用蜜攻散用水煎求速用湯散求緩用丸服在用者之自審焉

一是書所用之方多有加減與古方往往不合然藥雖不合而理則相契與經方之法固不背也

一婦人小兒除胎產麻痘外悉如男子治法且各有專書閱者能得此書之意自可辨各書之得失而取用焉無容多贅也  
一諸瘡刀傷子另著有外科說意一書茲不具錄

醫學一見能目錄

經氣

診法

望色

聞聲

問證

切脈

證治

頭骨

兩耳

眼目

唇口

鼻孔

牙齒

舌本

咽喉

胸前

大腹

小腹

脇肋

背上

腰中

手臂

腳腿

前陰

後陰

大便

小便

寒熱

嘔吐

欬嗽

喘嗽

失血

遺精

言語

心神

斑黃

出汗

腫脹

飲食

起居

倒仆

抽搐

蟲蠱

鬼祟

婦科

調經

安胎

保產

兒科

外證

內傷

醫學一見能全卷

四川彭縣容川唐宗海著

經氣

足太陽	手太陽	足少陽	足太陰	足少陰	足厥陰
<small>膀胱</small>	<small>胃</small>	<small>膽</small>	<small>脾</small>	<small>腎</small>	<small>肝</small>
經	經	經	經	經	經
寒水	燥金	木火	溼土	水陰	風木
之氣	之氣	之氣	之氣	之氣	之氣
手從足化	手從足化	手從足化	手從足化	手從足化	手從足化
統稱寒水	統稱燥金	統稱木火	統稱溼土	統稱君火	統稱風木
經行身之前	經行身之前	經行身之前	經行身之前	經行身之前	經行身之前



望色

聞聲

青色 風邪也 亦主脾寒

肝志怒 其聲呼

黃色 溼氣也 亦主食積

心志喜 其聲笑

赤色 火熱也 亦主假熱

脾志思 其聲歌

白色 虛寒也 亦主血脫

肺志憂 其聲哭

黑色 水氣也 亦主腎虛

腎志恐 其聲呻

問證

問病因 七情六欲、風寒暑溼、飲食起居損傷驚恐之類是。  
問病形 痛癢寒熱、喘欬煩渴、吐利脹滿、便閉抽掣之類是。

問病機 朝甚暮愈暮熱朝寒進退盛衰變證兼證之類是  
問病情 惡寒惡熱苦嘔苦滿欲食不食心煩不寐之類是

切脈

浮 輕按即見

主表實

亦主裏氣內虛

沉 重按乃見

主裏實

亦主裏氣內虛

遲 一息三至

主虛寒

亦主在臟之病

數 一息六至

主實熱

亦主真寒假熱

虛 三部無力

主諸虛

亦主素稟不足

實 三部有力

主諸實

亦主素稟有餘

大應指洪濶

主病進

亦主正氣內虛

緩應指柔和

主病退

亦主胃氣有餘

長過於三指

主氣盛

亦主陽盛陰虛

短不滿三指

主氣損

亦主中有窒塞

滑往來流利

主血走

亦主痰飲為病

濇往來艱滯

主血虛

亦主瘀血凝積

洪湧沸有力

主實熱

亦主內虛不足

緊勁急無定

主寒實

亦主身體疼痛

細窄小不粗

主冷氣

亦主血脈不足

微 模糊不顯 主陽虛

亦主元氣敗絕

訖 浮大中空 主血亡

亦主遺精小產

絃 端直中勁 主木旺

亦主痰飲內痛

草 浮極有力 主陰亡

亦主陽不入陰

牢 沉極有力 主寒實

亦主內有積聚

濡 浮細無力 主氣虛

亦主外受溼氣

弱 沉細無力 主血虛

亦主胃氣不盛

動 搖曳在關 主驚氣

亦主陰陽相搏

伏 沉潛着骨 主邪閉

亦主陰寒在內

促數中時止 主陽盛 亦主邪氣內陷

結遲中時止 主氣鬱 亦主氣血漸衰

代止有定候 主氣絕 亦主經隧有阻

散去來繚亂 主氣散 亦主產婦之吉

浮沉分表裏。遲數定寒熱。虛實分盛衰。大緩辨進退。長有餘而短不足。滑流利而瀉艱難。寒熱緊洪俱屬實。細微血氣總為虛。乾中空而血亡。故道弦中勁而木侮脾經。草則陽氣外越。牢則陰邪內固。濡氣虛弱。血虛虛各有別。動氣搏弱。氣閉氣總乖和。結陰促陽。辨遲與數。代亡散絕。有去無來。脈法多端。此為總索。

# 頭證

頭乃三陽所總司。藥分三面按經施。若還眩運分虛實。泄實滋虛兩路馳。

頭痛在後。或兼發熱惡寒者。太陽經傷寒也。宜加味敗毒散。

沙參 羌活 獨活 柴胡 前胡 川芎 桔梗

枳殼 雲苓 甘草 生薑 蔥白 粉葛 大棗

頭痛在側。或兼寒熱往來者。少陽經傷風也。宜加味柴胡湯。

柴胡 黃芩 半夏 黨參 川芎

白芍 荆芥 生薑 甘草 大棗

頭痛在前。或兼發熱口渴者。陽明經傷熱也。宜加味升葛湯。

升麻 粉葛 白芍 黃芩 白芷 花粉 甘草  
雷頭風痛。或偏在左在右者。陽虛中風寒也。宜艾炷鹽摩法。  
艾茸麝香作小粒灸痛處。附子末和鹽摩之。

頭痛如碎。每遇陰雨更甚者。真陽不上頭也。宜加味白通湯。  
乾薑 附子 葱白 白朮 甘草 黃芪 黨參

頭痛如破。兼見嘔吐漩沫者。肝寒邪上逆也。宜加味吳萸湯。  
吳萸 黨參 大棗 生薑 桂尖

雲苓 白芍 甘草 細辛 半夏

頭暈鬱冒。其人煩渴悶滿者。火挾痰上泛也。宜加味二陳湯。

陳皮 半夏 雲苓 甘草 枳殼 旋覆

黃芩 酒軍 柴胡 卜荷 杏仁 竹茹

頭暈飄搖。其人兩顴發赤者。腎經虛火動也。宜加味地黃湯。

熟地 東皮 淮藥 茯苓 丹皮 澤瀉 安桂

牛膝 附子 川芎 細辛 寸冬 元參 磁石

# 耳證

耳雖腎竅。辨聲音。繞耳游行。是膽經。  
時輩不知清木火。漫將滋腎。謂高明。

耳鳴耳聾。或兼口苦寒熱者。少陽經風熱也。宜仲景柴胡湯。

柴胡 人參 甘草 黃芩 半夏 生薑 大棗



耳鳴耳聾。或兼脇痛善怒者。肝經之火鬱也。宜龍膽瀉肝湯。

當歸 生地 柴胡 黃芩 梔子 木通

澤瀉 膽草 前仁 牡蠣 甘草 青皮

耳鳴耳聾。並無障礙壅閉者。腎虛陰氣逆也。宜加味磁珠丸。

磁石 硃砂 熟地 桑皮 五味

淮藥 雲苓 澤瀉 丹皮 菖蒲

## 目 證

眼皮腫痛。貴分觀。按經清散。自然安。  
若還雲霧。暈花見。補瀉隨宜。屬腎肝。

大眼角腫。或兼頭痛惡寒者。太陽經風熱也。宜加減敗毒散。

羌活 獨活 柴胡 前胡 赤芍 黃芩 蟬退  
玉竹 歸尾 木賊 花粉 甘草 連翹 銀花  
小眼角腫或兼口苦耳鳴者少陽經風火也宜加減柴胡湯  
沙參 白 柴胡 黃芩 木賊 膽草 當歸  
蟬退 銀花 菊花 甘草 生薑 牡蠣 青皮  
下眼皮腫以及繞眼紅鎖者陽明經風熱也宜加味升麻湯  
升麻 粉葛 白芍 甘草 黃芩 生地 大力  
銀花 白芷 花粉 蟬退 青箱 決明 石膏  
目內癢痛以及赤白雲翳者肝經風溼熱也宜加減瀉肝湯

當歸 生地 梔子 黃芩 膽草 蟬退 木賊

木通 銀花 赤芍 澤瀉 柴胡 防風 荊芥

前仁 青皮 枳殼 細辛 酒軍 紅花 甘藷

目光晦澀恍惚不能近視者肝腎真陰虛也宜杞菊地黃湯

枸杞 杭菊 熟地 桑皮 淮藥

雲苓 丹皮 澤瀉 決明 桑葉

目光浮散昏花不能遠視者心腎真陽虛也宜參朮磁硃丸

人參 白朮 遠志 黃芪 磁石 硃砂

當歸 桑仁 龍眼 益智 五味 甘草

# 口證

口內時含五臟和。偶然變味即為疴。須知脾竅原通胃。胃火為殃病最多。

口苦而渴。或兼咽乾目眩者。少陽經相火也。宜加減柴胡湯

柴胡 黃芩 黨參 花粉 生薑 甘草

口吐酸水。或氣腹滿頭痛者。肝木侮脾土也。宜加味吳萸湯

吳萸 生薑 老連 黨參 大棗

口甜而膩。或兼不思飲食者。脾虛傷厚味也。宜加味香砂湯。

白朮 雲苓 黨參 甘草 半夏 廣香 砂仁

神麴 查肉 老連 藿香 生薑 檳榔 白芍

口淡無味。兼見腹滿多唾者。脾虛中有寒也。宜仲景理中湯。

黨參 白朮 生薑 甘草

口中腫痛。兼見發渴飲水者。胃中火上衝也。宜時方甘露飲。

天冬 麥冬 生地 熟地 黃芩 石斛

茵陳 枳殼 甘草 枇杷葉

口燥舌乾。或兼消渴引飲者。胃中陰液枯也。宜加減地黃湯。

熟地 淮藥 東皮 寸冬 黨參

五味 元參 澤瀉 花粉 粉葛

口中腥臭。或兼吐血衄血者。胃中血燥故也。宜清陽甯血湯。

黨參 寸冬 白芍 黃芩 黃連 當歸

生地 藕節 蒲黃 枳殼 酒軍 甘草

鼻

證

肺氣通調鼻自安只宜疎散肺風寒。  
却因挾孔陽明脈。惹出干清燥熱端。

鼻流清涕。如有窒塞不通者。肺經受風寒也。宜加味香薷引

香附 紫蘇 陳皮 甘草

薄荷 杏仁 辛夷 桔梗

鼻根紅赤。孔內乾燥結煤者。陽明經燥氣也。宜加味升葛湯

升麻 葛根 白芍 黃芩 生地

甘草 花粉 白芷 銀花 連翹

鼻中流血。或兼頭暈口渴者。陽明經血燥也。宜加味甘露飲。

生地 熟地 黃芩 寸冬 天冬 茵陳 石斛

枳殼 茅根 赤芍 蒲黃 銀花 藕節 甘草

# 齒證

胃主牙。牀腎主牙。補虛清熱各專家。  
倘因風化生蟲。蟻抵穴。採巢外治證。

牙齒疼痛。由於生蟲蝕剥者。風溼熱所化也。宜烏梅化蟲散。

烏梅 川椒 乾薑 細辛 黃連

黃柏 明雄 鉛粉 枯礬 石膏

牙牀腫痛。或兼口舌皆痛者。胃經之風火也。宜清熱去風湯。

枯芩 石膏 知母 枳殼 丹皮 白芍 牛膝

白芷 防風 銀花 大力 連翹 豆根 甘草

牙痛不腫。或腫不利。涼藥者。腎中之虛火也。宜加減八味丸。

熟地 淮藥 雲苓 澤瀉 丹皮 碎補

安桂 附子 桑皮 白芍 牛膝 寸冬

## 舌證

舌乃心苗。胃亦診。赤紅便作火來侵。有胎屬火分真假。枯潤之間仔細評。

舌尖赤痛。或生鉅齒紅點者。心經之遊火也。宜加減瀉心湯。



黃芩 黃連 連翹 大力 赤芍 丹皮

花粉 當歸 前仁 木通 生地 甘草

舌胎黃燥。兼見消渴引飲者。胃中有熱邪也。宜加味白虎湯

知母 石膏 花粉 枳殼 酒軍 甘草 生地

舌胎滑潤。兼見面赤身熱者。真寒而假熱也。宜加味益元湯

附片 乾薑 艾葉 五味 知母 黃連

黨參 白朮 吳萸 寸冬 童便 葱白

舌黑生刺。手足日晡潮熱者。胃中有燥屎也。宜調胃承氣湯

枳殼 厚朴 大黃 芒硝 甘草

舌黑生刺。心煩不得安臥者。心火之亢熱也。宜銀翹瀉心湯。

黃柏 炒梔 黃連 黃芩 白芍 燈心

花粉 銀花 連翹 生地 竹茹 草梢

# 喉證

最重咽喉出納關。邪禁邪氣壅其間。清心開肺還平胃。惟望醫師妙轉旋。

咽喉腫痛。其色多帶紅赤者。風火之壅塞也。宜加味甘桔湯。

桔梗 甘草 豆根 連翹 麝干 炒梔

荊芥 薄荷 貝母 杏仁 枯芩 枳殼

咽中生瘡。其聲嘶小不出者。火熱乘肺金也。宜滋腎百合湯。

知母 黃柏 天冬 寸冬 蚊蛤

百合 紫苑 杏仁 生地 甘草

咽中疼痛起黃白色小點者。溼熱之結氣也。宜清散薄荷湯

薄荷 柴胡 荊芥 羌活 枳殼 連翹 射干

黃芩 知母 檳榔 草果 杏仁 薑蟬 蟬退

咽中生蛾。壅塞關隘不通者。心經火上逆也。宜加減導赤散

生地 木通 甘草 竹葉 山甲 薄荷 酒軍

靈仙 知母 枳殼 大力 皂刺 羌活 老連

# 胸前

上焦心肺屬胸中。空濶無塵比太空。寒熱血痰相阻滯。開提升降具全功。

胸前脹滿。兼見口渴脇痛者。少陽氣不暢也。宜加減柴胡湯。

柴胡 半夏 人參 瓜霜 黃芩

生薑 大棗 甘草 枳殼 杏仁

胸前痺痛。兼見痛而微背者。心肺之陽鬱也。宜瓜萸薤白湯。

桂枝 生薑 枳殼 瓜萸 薤白 清酒

胸前脹滿。飯後更覺痞滿者。胃虛而生痰也。宜香砂六君湯。

白朮 雲苓 黨參 半夏 廣香 陳皮 砂仁

甘草 生薑 大棗

胸前結痛不可觸近按摩者水火相搏結也宜陷胸消息湯

甘遂<sup>少</sup> 大黃<sup>少</sup> 芒硝<sup>少</sup>

胸前脹滿游行有聲而嘔者膈上有痰水也宜加味二陳湯

桔梗 貝母 法夏 枳殼 雲苓 陳皮

甘草 白芥 蘇子 白朮 苡仁 生薑

胸前疼痛徹骨徹心不止者寒氣相攻衝也宜烏頭赤丸方

烏頭 蜀椒 乾薑 附子 赤石脂

胸前煩痛口酸口苦悶鬱者火氣之結滯也宜肅清舒氣湯

吳黃少老連 百合 丹參 菖蒲 前仁

桔梗 枳殼 尖貝 當歸 炒梔 雲苓

# 大腹

大腹中州總屬脾。虛寒實熱辨毫釐。  
木邪水溼皆為寇。痰血蛔蟲亦易滋。

大腹絞痛。閉悶不得吐瀉者。脾實而熱閉也。宜金匱三物湯

枳殼 厚朴 大黃

腹中切痛。兼見吐瀉厥冷者。脾虛發藿亂也。宜仲景理中湯

人參 白朮 乾薑 甘草

腹中脹滿。飯後倦怠反飽者。脾虛少運化也。宜香砂六君湯

廣香 砂仁 白朮 人參 雲苓 甘草

陳皮 半夏 生薑 大棗 芡實 麥牙

腹中脹滿兼見大便溏泄者。溼甚則濡泄也。宜時方胃苓湯

蒼朮 陳皮 厚朴 甘草 豬苓 大棗

澤瀉 雲苓 白朮 桂枝 生薑 白芍

腹中疼痛。有物自臍衝上者。腎氣之奔豚也。宜腎氣奔豚湯

桂枝 白朮 雲苓 甘草 大棗 附子 砂仁

腹中疼痛。有物自左衝上者。肝氣之奔豚也。宜肝氣奔豚湯

吳萸 老連 烏梅 牡蠣 香附 荔枝 雲苓

腹中大痛。有物突起拒摩者。虛寒現實象也。宜大建中原方

人參 蜀椒 乾薑 飴糖

腹痛喜按。舌上有白花點者。內有蛔蟲擾也。宜醋製烏梅丸

黨參 當歸 黃柏 黃連 細辛

附子 乾薑 花椒 桂枝 烏梅

多

腹中絞痛。串走兩脇。鳴痛者。痰飲之積聚也。宜加味二陳湯

陳皮 半夏 雲苓 甘草 白芥 前胡 蘇枝

腹中刺痛。脈澀痛如刀錐者。瘀血之阻滯也。宜加減桃仁湯

桃仁 桂枝 芒硝 酒軍 歸尾 靈脂



腹中猝痛。由傷風邪而得者。肝氣侮脾土也。宜柴胡桂枝湯。

柴胡 黃芩 半夏 人參 青皮 少

桂枝 白芍 甘草 大棗 生薑

腹中猝痛。由傷邪崇而得者。異氣亂正氣也。宜加減正氣散。

蒼朮 陳皮 廣香 黨參 雲苓 桂心

天麻 麝香 少 半夏 大棗 生薑 龍骨 煨

## 小腹

膀胱胞室與肝經。時輩猶知此數層。獨於瘕氣和寒疝。此意從來少識人。

小腹滿痛。由於小便不通者。膀胱之水結也。宜加味五苓散。

白朮 雲苓 桂枝 猪苓 澤瀉 白芍 杏仁  
小腹滿痛。小便仍然通利者。胞宮之血結也。宜加減桃仁湯  
方見大腹證

小腹絞痛。繞臍上下難忍者。下焦之寒疝也。宜烏頭羊肉湯  
當歸 生薑 烏頭炮 羊肉

小腹旁痛。以及軟肋俱痛者。厥陰血不和也。宜當歸四逆湯  
當歸 桂枝 細辛 白芍 木通 生地 雲苓  
香附 靈脂 甘草 橘葉 艾葉 川芎 台烏  
小腹疼痛得屁腹鳴乃快者。小腸氣不和也。宜普明橘核丸

橘核 吳萸 香附 棟子 查核 荔枝 小茴

# 脇肋

側邊肝膽所分司。和暢陰陽兩得宜。  
若係結疼宜破利。非痰即血莫遲疑。

兩脇下痛難於俯仰屈伸者。少陽氣不和也。宜加減小柴胡

黨參 柴胡 黃芩 半夏

青皮 牡蠣 生薑 甘草

兩脇下痛穿透游走有聲者。肝脾之痰飲也。宜加味二陳湯

方見大腹證

兩軟脇痛。以及小腹俱痛者。厥陰血不和也。宜當歸四逆湯

方見小腹證

脇下偏痛。痞結硬滿不去者。氣血痰三積也。宜三消去痞湯

附子 細辛 大黃 白芥 靈脂 香附

背證

太陽與肺氣如天。統主諸陽。背上旋。  
實證最多。虛證少。無分虛實。總驅寒。

背惡寒冷。由於外感發熱者。太陽經傷寒也。宜人參敗毒散

羌活 獨活 柴胡 前胡 川芎 枳殼 沙參

桔梗 杏仁 茯苓 甘草 生薑 大棗 粉葛

背惡寒冷。或兼手足清冷者。太陽經陽虛也。宜原方附子湯

附子 白朮 人參 白芍 雲苓

背痛連項。或兼發熱惡寒者。太陽經風寒也。宜人參敗毒散

方見上

背痛連肩。或兼吐痰咳嗽者。肺經有痰飲也。宜加減敗毒散

羌活 獨活 柴胡 前胡 枳殼 桔梗 大棗

雲苓 半夏 杏仁 蘇子 枯芩 生薑 竹茹

# 腰證

腰為腎竅。宜補溫。溼着血瘀。皆令疼。亦有痛連肩背者。太陽經病。討根源。

腰間沉痛。如帶五千錢。重者。腎經受寒溼也。宜時方腎着湯

乾薑 白朮 雲苓 甘草

腰痛難忍。如刀錐相刺割者。瘀血積腰際也。宜鹿角利腰湯。

鹿角 歸尾 白芍 丹皮 紅花 牛膝 續斷

腰痛倦弱。或兼小便不利者。虛勞腎氣弱也。宜金匱腎氣丸。

熟地 桑皮 淮藥 雲苓

附子 安桂 澤瀉 丹皮

腰痛連背。或兼寒熱頭疼者。風寒襲太陽也。宜人參敗毒散。

方見背證

# 手證

手為四末屬脾經掌中又屬少陰心。  
厥熱兩條須辨治。熱潮時節要分明。

手發厥冷。或兼泄利清穀者。脾腎之虛寒也。宜附子理中湯。

乾薑 附子 黨參 白朮 甘草

手發潮熱。兼見譫語舌黑者。胃中有燥屎也。宜調胃承氣湯。

枳殼 朴硝 大黃 厚朴 甘草

手心發熱。多在入夜以後者。瘀血在陰分也。宜四物加味湯。

生地 當歸 川芎 白芍 丹皮 桃仁 桂尖

麥冬 桑葉 浮麥 竹葉 燈心 蒲黃 全皮

手心發熱必在午飯以後者。脾胃停飲食也。宜加味平脾湯。

蒼朮 厚朴 陳皮 甘草 神麴 酒軍 白芍

手痛麻木通腕皆痛不仁者。風寒溼合痺也。宜五物逐痺湯。

當歸 白芍 桂尖 秦艽 苡仁 桑皮 竹茹

防風 紅花 荆芥 續斷 生地 鈎藤 清酒

## 腳證

足居下部腎之分。又屬陽明灌大筋。寒熱腫疼依法治。總於胃腎問原因。

腳冷厥逆。或兼下利清穀者。脾腎之虛寒也。宜經方四逆湯。

乾薑 附片 甘草



腳發熱厥。夜睡不欲被覆者。腎中真陰虛也。宜六味地黃湯。

熟地 芡皮 淮藥 茯苓 丹皮 澤瀉

腳跗腫大。青白如蠶。明亮者。寒溼之氣注也。宜神仙雞鳴散。

吳萸 蒼朮 紫蘇 生薑 苡仁

木瓜 陳皮 檳榔 桔梗 雲苓

腳跗赤腫。以及生瘡潰爛者。溼熱之下注也。宜蒼朮知母湯。

蒼朮 知母 白朮 雲苓 枯苓 白芍 續斷

秦皮 茵陳 桑皮 全皮 桂枝 防己 甘草

婦人腳心疼痛如刀錐刺者。少陰經瘀血也。宜仲景溫經湯。

當歸 白芍 阿膠 川芎 桂枝 甘草

寸冬 半夏 吳萸 生薑 人參 丹皮

## 前陰

男女前陰總屬肝。肝經縈繞在其端。祇從此處求真訣。按法施方本已探。

前陰瘡溼。以及赤腫生瘡者。肝經之溼熱也。宜龍膽瀉肝湯方見耳證。

陰囊脹結。痛引小腹。內者肝經之疝氣也。宜茴香五苓散方。

小茴 荔枝 橘核 棟核 歸尾 香附 白朮  
台烏 豬苓 澤瀉 桂尖 檳榔 白芍 雲苓



前陰暴縮。或氣轉筋入腹者。肝腎之虛寒也。宜加味四逆湯。  
乾薑 附子 烏頭 當歸 人參 雲苓 甘草  
陰囊縮入。兼見舌捲心熱者。肝經之熱邪也。宜生犀瀉肝湯。  
生地 犀角 白芍 大黃 當歸 知母 薤蓉  
陰莖蟲蝕。以及婦人陰蝕者。古之狐惑病也。宜外洗苦參湯。  
苦參煎洗。亦可內服龍膽瀉肝湯。

# 後陰

後陰脫肛。乃為虛。以外俱將實証醫。  
大抵燥金多燥熱。即從燥氣定權輿。

後陰脫出。屎後良久乃入者。中氣下陷故也。宜補中益氣湯。

黨參 白朮 黃芪 當歸 大棗

柴胡 升麻 生薑 甘草 陳皮

後陰瘡痔。一切腫痛諸苦者。陽明之血燥也。宜麻仁地榆湯。

麻仁 地榆 當歸 白芍 杏仁 銀花

黃芩 黃連 槐實 桔梗 生地 大力

# 大便

大便無分結與溏。只將寒熱細評章。至於痢證尤難治。還望醫師妙主張。

大腸不通。口渴而小便黃者。陽明之燥結也。宜加味承氣湯。

生地 花粉 大黃 芒硝 枳殼 厚朴 甘草

大便不通。口和而小便清者。脾寒氣凝結也。宜加味理中湯。  
當歸 白芍 人參 白朮 乾薑 甘草

大便溏泄。其色青白。完穀者。脾經寒溼氣也。宜胃苓加味湯。

蒼朮 陳皮 甘草 茯苓 桂枝 附子 大棗

白朮 厚朴 豬苓 澤瀉 肉蓯 乾薑 白芍

大便溏瀉。其色濁垢膠膩者。腸中之溼熱也。宜清熱胃苓湯。

蒼朮 滑石 木通 厚朴 雲苓 黃芩 梔子

陳皮 甘草 澤瀉 白朮 白芍 黃連 當歸

大便溏瀉。必在五更時分者。腎寒而侮脾也。宜加味四神丸。

附子 肉叩 白朮 雲苓 大棗 甘草

吳茱 乾薑 人參 五味 生薑 粟殼

大便完穀。食入即刻利出者。肺熱而暴注也。宜瀉肺止利湯。

黃芩 知母 老連 大黃 石膏 桔梗

粉葛 桑皮 人參 生地 白芍 粟殼

便瀉赤白。下部逼脹難通者。溼熱之鬱利也。宜加減芍藥湯。

柴胡 當歸 白芍 甘草 檳榔 粉葛 杏仁

桔梗 木香 黃芩 黃連 綠豆 銀花 荷葉

便痢純赤。審係口渴屬熱者。熱結在血分也。宜地榆白頭湯。

黃連 黃芩 黃柏 秦皮 白頭翁

地榆 當歸 白芍 丹皮 銀花炭

便利禁口。其人飲食不納者。邪熱傷中氣也。宜人參開禁湯。

人參 老連 胡蓮 石解 知母 連翹 廣香

花粉 寸冬 桔梗 粉葛 銀花 大力 甘草

下痢純白。其人腹脹口和者。腸胃之鬱滯也。宜黃芩平胃散。

黃芩 蒼朮 厚朴 陳皮 豬苓 生薑

甘草 雲苓 澤瀉 木香 柴胡 芍藥

大便久痢。諸藥不能禁止者。寒熱之錯雜也。宜乾連四神丸。

乾薑 黃連 烏梅 白芍 甘草

# 小便

三焦決瀆為出路。肺主通調脾轉布。但治小腸與膀胱。世人那得知其故。

小便赤短。別無外證。內傷者。小腸經火氣也。宜加味導赤散。

生地 木通 卓梢 竹葉 滑石 山梔 黃芩

小便白濁。甚則盡如米飲者。脾經之溼氣也。宜華蘼分清飲。

華蘼 菖蒲 甘草 益智 烏藥 青鹽 神麴

小便短澀。每溺則澀而痛者。膀胱之熱淋也。宜車前五淋散。

當歸 白芍 赤苓 梔仁 甘草 燈心 前仁



小便不通。點滴俱不能出者。膀胱之熱結也。宜滋腎通關。凡

黃柏

多知母多安桂少

小便帶血。或紫莖中割痛者。熱動胞之血也。宜加味五淋散

當歸

赤芍

甘草

牛膝

鬱金

生地

膽草

白芍

梔仁

燈心

桃仁

麝香

木通

前仁

小便不通。諸藥俱不效驗者。氣道迫塞故也。宜通氣麻杏湯

麻黃

杏仁

甘草

小便過多。以及遺溺不禁者。膀胱與腎寒也。宜附子溫腎丸

附子

安桂

熟地

桑皮

白朮

青鹽

# 寒熱

寒熱陰陽朕兆機互根互換理難知。或虛或實分真假。表理能明乃可醫。

發熱惡寒。皮毛灑淅無汗者。風寒閉膚表也。宜原方麻黃湯。

麻黃 桂枝 杏仁 甘草

發熱惡風。翕翕然而自汗者。風寒襲腠裏也。宜原方桂枝湯。

桂枝 白芍 甘草 大棗 生薑

但熱不寒。口乾舌燥便黃者。陽明之燥熱也。宜原方白虎湯。

石膏 知母 甘草 粳米

但寒不熱。並無燥渴等證者。少陰之陽虛也。宜長沙附子湯。

附子 白朮 人參 雲苓 甘草

皮膚發熱。夜晚潮熱更甚者。陰血不濡陽也。宜當歸補血湯。

當歸 生地 黃芪 人參 枯苓 夜合葉

棗皮 百合 寸冬 黃柏 龜板 慈竹葉

子午發熱。睡後更覺盜熱者。虛勞骨蒸熱也。宜柴胡清蒸湯。

柴胡 黃芩 當歸 白芍 生地 丹皮 桃仁

蒲黃 鼈甲 膽草 雲苓 貝母 杏仁 甘草

寒熱往來。發作有定時候者。少陽經瘧疾也。宜草果黃芩湯。

草果 黃芩 知母 柴胡 羌活 花粉 檳榔

厚朴 枳殼 杏仁 炒梔 石膏 卜荷 甘草  
朝發寒冷。入夜則又發熱者。陽氣陷入陰也。宜補中益氣湯  
方見後陰證

身熱面赤。下利清水完穀者。裏寒而外熱也。宜加味白通湯  
乾薑 附子 蔥白 人尿 豬膽

身熱面赤。煩燥欲臥泥水者。陰甚而格陽也。宜益元艾附湯  
人參 乾薑 附子 艾葉 寸冬 童便

黃連 甘草 知母 五味 故紙 蔥白

春月發熱。氣喘而口乾渴者。感風熱之氣也。宜加減麻杏湯

杏仁 麻黃 石膏 甘草 白芍 薑蠶

花粉 連翹 銀花 大力 知母 蟬退

夏月發熱。口渴而心煩懊者。傷暑熱之氣也。宜加味六一散。

炒梔 寸冬 滑石 甘草 黃芩 花粉 杏仁

香菇 石膏 厚朴 木通 荊芥 知母 銀花

# 嘔吐

寒熱陰陽細品評。總因氣逆嘔斯生。  
降衝安胃開邪拒。氣不奔騰嘔自平。

嘔吐不食。水飲不得入口者。火熱相拒隔也。宜人參乾薑湯。

人參 黃連 黃芩 乾薑 少

嘔吐能食。食入即時吐出者。兩熱相爭。沖也。宜酒蒸大黃湯。

大黃 甘草

食久乃吐。兼見大腹脹滿者。脾經之火化也。宜薑附六君湯。

人參 白朮 雲苓 甘草

半夏 陳皮 乾薑 附子

食久乃吐。兼見胸前脹滿者。胃府之虛寒也。宜香砂養胃湯。

廣香 砂仁 白朮 雲苓 陳皮

半夏 甘草 人參 大棗 生薑

食久乃吐。吐出多帶水液者。腎部之虛寒也。宜仲景真武湯。

白朮 雲苓 白芍 生薑 附子

食久乃吐。吐出多帶酸水者。肝部之虛寒也。宜吳茱萸原方。

吳萸 生薑 人參 大棗

單吐痰涎。或兼欬嗽頭痛者。胃中有痰飲也。宜加味二陳湯。

陳皮 半夏 雲苓 甘草 生薑 竹瀝

單吐酸水。或兼頭痛如破者。肝寒氣上逆也。宜加味左金丸。

吳萸 雅連 人參 雲苓 細辛 苡仁

嘔吐不止。兼見腹痛下利者。脾氣之虛脫也。宜附子理中湯。

附子 白朮 人參 乾薑 甘草

嘔吐發熱。或兼口苦胸滿者。少陽之逆氣也。宜原方柴胡湯。

黃芩 柴胡 人參 生薑

半夏 甘草 大棗

卒然嘔吐。兼見發悶惡心者。感瘴厲異氣也。宜藿香正氣散。

白朮 半夏 雲苓 白芷 腹毛 生薑 砂仁

厚朴 陳皮 桔梗 紫蘇 藿香 大棗 甘草

欬嗽

肺氣如鍾撞則鳴。或痰或血治須分。再加和胃疏肝法。欬血之原即此尋。

外感欬嗽。吐痰清白而凝者。傷寒而動水也。宜小青龍真方。



桂枝 半夏 麻黃 甘草

乾薑 細辛 白芍 五味

外感欬嗽吐痰黃色而凝者。傷風動火氣也。宜麥門冬新方

麥冬 黃芩 桔梗 桑皮 瓜蒌 杏仁 貝母

柴胡 雲苓 紫苑 薄荷 花粉 枳殼 甘草

久欬上氣痰凝多而聲易者。肺腎之陽虛也。宜加味真武湯

白朮 雲苓 白芍 五味 附子 乾薑 細辛

久欬上氣聲乾澀而痰凝者。肺腎之陰虛也。宜加味豬苓湯

阿膠 白合 寸冬 貝母 澤瀉 滑石

五味 豬苓 雲苓 丹皮 海粉 生地

小兒欬嗽連哈數十餘聲者肝血之不和也宜加味道遙散

當歸 白芍 雲苓 柴胡 煨薑 薄荷 甘草

白朮 丹皮 五味 黃芩 半夏 香附 丹參

婦人乾欬由於經水不行者衝任之氣逆也宜變化柴胡湯

柴胡 香附 元胡 丹皮 當歸 雲苓 貝母

黃芩 寸冬 牛膝 桃仁 法夏 白芍 甘草

# 喘 齁

喘齁二證本多痰亦有虛時屬腎關。開口便言中氣弱。那知化氣水須捐。

氣喘而促。審係呼出氣短者。內有停水飲也。宜二陳五苓散。  
半夏 五味 甘草 陳皮 白朮

豬苓 澤瀉 雲苓 桂尖 細辛

氣喘而促。審係吸入氣短者。腎中之氣虛也。宜八味腎氣丸。  
方見腰證

胸膈有聲。喉中漉漉不利者。痰氣為寒阻也。宜破痰麝干丸。  
射干 半夏 陳皮 百部 冬花 細辛 乾薑

五味 貝母 雲苓 郁李 阜角 枯苓 枳殼  
氣緊喘促。鼻塞聲音不利者。風寒閉肺竅也。宜蘇子降氣湯。

蘇子 半夏 當歸 陳皮 生薑

厚朴 沉香 前胡 柴胡 甘草

喘逆上氣。或兼噫氣乾欬者。肺胃之火逆也。宜清熱降逆湯。

生地 白芍 石膏 知母 花粉

枯苓 枳殼 旋覆 杏仁 赭石

# 失血

血隨氣布。要循經。氣上因而血沸騰。降逆消瘀為妙訣。莫施補劑致癆蒸。

驟然吐血。兼見頭痛寒熱者。外感傷經脈也。宜麻黃芍藥湯。

藕節 枯苓 生地 川芎 白芍 當歸 麻黃

丹皮 香附 寸冬 杏仁 蒲黃 枳殼 甘草

吐血口渴。脈洪數而溺赤者。火熱傷陰分也。宜加味四生丸。

生地 艾葉 柏葉 荷葉 丹皮 馬通

枯苓 酒軍 知母 花粉 茅根 牛膝

吐血口和。脈絃微而溺赤者。陽虛而陰脫也。宜變化理中湯。

黨參 黃芪 黑薑 甘草 白芍 馬通

白朮 五味 當歸 木香 側柏 醋艾

吐後口渴。血帶黑而腹痛者。瘀血積腹裏也。宜加味四物湯。

生地 當歸 川芎 白芍 桃仁

大黃 丹皮 香附 枳殼 降香

吐血之前。必先大發惡心者。血潮而凌心也。宜乳香沒藥散

乳香 沒藥 生地 寸冬 牛膝 五味 丹皮

炒梔 當歸 白芍 硃砂 玉竹 棗仁 知母

先行欬嗽。然後得吐血證者。肺燥傷陰脈也。宜清燥和血湯

生地 寸冬 百合 五味 當歸 貝母 杏仁

續斷 藕節 荊芥 竹茹 蒲黃 紅花 降香

先行吐血。然後得欬嗽證者。陰陽不相附也。宜調陰和陽湯

當歸 白芍 生地 阿膠 五味 百合 貝母

杏仁 沉香 牛膝 白薇 龍骨 牡蠣 降香

吐血之後。肌肉魚鱗甲錯者。腹中有乾血也。宜大黃廔蟲丸。

大黃 桃仁 蟲蟲 水蛭 甘草

廔蟲 蟪螬 阿膠 當歸 炒芥

大便下血。其下在糞之前者。腸風瘡痔類也。宜赤豆加味散。

當歸 地榆 赤豆芽 銀花 防已 寸冬 大力

丹皮 白芍 槐角 棕灰 杏仁 黃柏 甘草

大便下血。其下在糞之後者。肝脾不統血也。宜仲景黃土湯。

白朮 附子 甘草 生地 黃芩 阿膠 竈心土

通身汗血甚則露衣盡赤者。火甚而血溢也。宜加味六黃湯。  
當歸 黃連 黃芩 黃柏 蟬退 酒軍 全皮  
生地 黃芪 熟地 白芍 竹茹 杏仁 甘草  
鼻中流血以及齒縫出血者。胃中之燥熱也。宜清涼甘露飲。  
方見口證

## 遺精

夢中所見乃肝魂。魂不清兮夢不甯。  
若是陰精無夢泄。失於鎖鑰責司門。

遺精有夢。或兼心煩善怒者。心肝之火邪也。宜龍瀉瀉肝湯。  
柴胡 木通 前仁 炒梔 當歸 牡蠣 遠志



黃芩 澤瀉 生地 膽草 甘草 丹皮 燈心  
遺精無夢。或兼陰頭寒冷者。腎元之陽虛也。宜古方天雄散  
天雄 桂尖 牡蠣 龍骨

# 言語

言屬心聲。出肺關。心經痰火。語言愆。  
若還肺竅氣嘶塞。升散開提。病自安。

言語聲嘶。喉痺而咽。生瘡者。肺金被火剋也。宜尖貝平肺散。

尖貝 天冬 寸冬 百合 兒茶 百部

薄荷 知母 石膏 杏仁 冰糖 甘草

語言蹇滯。脣緩而流涎沫者。脾經中風證也。宜資壽解語湯。

附子 安桂 防風 羌活 天麻

麥仁 甘草 羚羊 薑汁 竹汁

昏冒不語遺溺直視足廢者心腎經中風也宜地黃飲子方

安桂 茯苓 熟地 遠志 五味 巴戟 薄荷

附子 雲苓 寸冬 菖蒲 桑皮 石斛 枸杞

狂言見鬼舌黑而手足熱者胃中有實熱也宜三一承氣湯

大黃 芒硝 枳殼 厚朴 甘草

出言漫罵兼能棄衣登高者痰火迷心神也宜礞石滾痰丸

礞石<sup>火硝炒</sup> 黃芩 大黃 沉香

出言顛倒其人痴不識人者痰入心而癲也宜硃砂丹礬丸

黃丹炒 白礬煨 茶葉 硃砂 猪心血

卒倒不言牙關緊閉不開者外邪之聚中也宜吹鼻通關散

細辛 牙皂

卒倒作聲有如羊犬等狀者風痰發癇證也宜加味二陳湯

陳皮 半夏 雲苓 甘草 防風 竹茹

枳殼 生薑 前胡 枯芩 鬱金 當歸

心神

心主神兮肝主魂腎藏精氣外游行

此間治法猶難識况挾長沙百合名

心中大煩。舌黑而不得卧者。少陰之陽煩也。宜黃連阿膠湯。

黃連 黃芩 阿膠 白芍 雞子黃

調下

心中大躁。手足躁擾不安者。少陰之陰躁也。宜加味白通湯。

乾薑 附子 葱白 童便 膽汁

心中怔忡。跳動如舂碓。白者。心胃之血虛也。宜加味歸脾湯。

白朮 寸冬 茯神 黨參 遠志 棗仁 當歸

黃芪 白芍 五味 龍眼 甘草 乳香 沒藥

心悸而怯。常欲叉手冒心者。水氣凌心經也。宜桂苓甘棗湯。

桂尖 雲苓 甘草 大棗

心驚而惕。神魂不能自主者。心虛而氣浮也。宜桂枝龍牡湯。  
桂枝 甘草 附子 龍骨 牡蠣

心神恍惚。入夜則多煩夢者。心血虛有火也。宜原方安神丸。  
當歸 生地 黃連 硃砂 甘草

心神恍惚。母事不能記憶者。有火兼有痰也。宜加味安神丸。  
龍骨 牡蠣 茯神 菖蒲 杏仁 生地 黃連  
硃砂 遠志 當歸 五味 甘草 貝母 寸冬

心神不定。起居百般不安者。百脈皆合病也。宜加味百合湯。  
黨參 白芍 百合 生地 玉竹 茯神

棗仁 寸冬 百部 五味 貝母 滑石

## 斑黃

陽明病氣陷脾鄉。挾濕因而外發黃。若但火邪傷血分。赤斑累累亢於陽。

發斑紅紫。身熱口中乾渴者。陽明經溼熱也。宜加減三黃湯。

花粉 犀角 黃芩 黃柏 炒梔 蟬退

銀花 白芍 枳殼 杏仁 歸尾 石膏

發黃明亮兼見口渴溺赤者。脾經之溼熱也。宜茵陳梔子湯。

炒梔 黃柏 茵陳 甘草

發黃黑暗兼見口和不渴者。脾經之寒溼也。宜茵陳五苓散。

桂枝 白朮 雲苓 豬苓 澤瀉 茵陳

# 出汗

古云盜汗屬陰虛。自汗陽羸。衛外疏。  
識得陰陽相附麗。互根當究五車書。

發熱出汗時見惡風灑灑者。傷風之外證也。宜古方桂枝湯  
方見寒熱證

睡後出汗。醒時則汗仍收者。陰虛而盜汗也。宜當歸六黃湯  
熟地 生地 當歸 黃芩 黃連 黃柏 黃芪  
醒時汗出。睡後則汗仍收者。陽虛而自汗也。宜參芪朮附湯

人參 黃芪 白朮 附子

# 腫脹

腫脹原由說的端總因水氣竄皮間。無分表裏和虛實。泄水扶脾病自安。

先首腫起以下及於手足者。傷於外之淫也。宜加味五皮飲。

陳皮 令皮 腹皮 薑皮 桑皮

麻黃 桂尖 杏仁 甘草 大棗

先腳腫起以上及於腹股者。內之水不行也。宜原方真武湯。

白朮 白芍 雲苓 生薑 附子

腫脹溺赤。或兼口渴脈數者。陽分之水氣也。宜加味五皮飲。

桑皮 苓皮 腹皮 薑皮 陳皮 木通



知母 防已 滑石

腫脹溺清。其口不渴。脈沉者。陰分之水氣也。宜原方真武湯方見上。

單腹脹大。其人黃瘦。少食者。脾虛而臌脹也。宜加味六君湯。

白朮 雲苓 陳皮 半夏 吳茱萸

黨參 甘草 廣香 砂仁 生薑

## 飲食

胃司飲食。命之根。欲惡之間。得病情。單指積滯一端說。非吾所謂個中人。

以而思食。每食又不能多者。脾強而胃弱也。宜重訂助胃丸。

蒼朮 甘草 砂仁 陳皮 生薑 吳萸

大棗 白寇 半夏 檀香 黨參 雲苓

食而善飽。每飽又作反脹者。胃強而脾弱也。宜抑胃扶脾湯。

寸冬 老連 黨參 白朮 乾薑

甘草 肉叩 廣香 麥牙 白芍

不善於食。而並不思飲食者。脾胃兩皆虛也。宜建中複理湯。

桂枝 白芍 甘草 大棗

飴糖 黨參 白朮 乾薑

喜飲冷水。以及消渴不止者。胃中虛熱故也。宜原方甘露飲。

方見口證

喜飲熱湯。或兼腹痛厥利者。脾部之虛寒也。宜附子理中湯。

附子 白朮 人參 生薑 甘草

傷食腹痛。兼見吐酸噯腐者。宿食停不去也。宜加減平胃散。

蒼朮 陳皮 厚朴 甘草 神麴 大黃 生薑

食入氣噎。因而哽噎不下者。肺氣不下降也。宜降脾平胃散。

百合 阿膠 半夏 寸冬

細辛 五味 杏仁 枳殼

食必飲送。無飲即不下咽者。胃氣不下降也。宜甘蜜半夏湯。

半夏 黨參 白蜜 甘瀾水

飲傷腹滿。兼見小便不利者。膀胱氣不化也。宜原方五苓散。

白朮 雲苓 豬苓 澤瀉 桂枝

# 起居

脾主四肢。膽主樞。氣機通暢。體輕舒。若還運動難為力。按法施方。莫舛途。

轉側艱難。以及曲伸不利者。少陽之樞逆也。宜原方柴胡湯。

方見頭證

身體沉重。四肢運動艱滯者。脾經有溼氣也。宜和脾利溼湯。

白朮 防己 木通 雲苓 蒼朮 澤瀉

# 倒仆

危急無如猝倒形。驟然跌仆舉家驚。不須問病從何起，閉脫分醫立起生。

猝倒地下。其證手撒目閉者。中風虛脫證也。宜急救三生飲。

附子 川烏 南星 麝香 黨參

猝倒地下。其象手握口噤者。中風實閉證也。宜吹鼻通關散。

生半夏 牙皂末 細辛末

# 制手動

筋脈從來貴潤柔。那堪風火兩相仇。相仇故爾相牽引。須向肝脾問厥由。

角弓反張。以及向後跌仆者。太陽經痙病也。宜防風竹茹湯。

防風 生地 白芍 粉葛 荊芥 花粉 竹茹

頭低足縮。以及向前跌仆者。陽明經痙病也。宜清陽已痙湯。

生地 寸冬 玉竹 石膏 芒硝 酒軍 甘草

一邊手足牽引搐搦不用者。少陽經痙病也。宜加味柴胡湯。

柴胡 枯苓 生薑 甘草 黨參

生地 羚羊 花粉 白芍 當歸

筋惕肉動振振然欲辟地者。寒水之內動也。宜仲景真武湯。

方見腫脹證

四肢拘急。以及焦痿不用者。火甚筋灼枯也。宜大劑補陰丸。

黃柏 知母 熟地 龜板 羚羊

牛膝 白芍 木瓜 當歸 玉竹

四肢軟弱。步履疲怠不收者。溼甚筋縱弛也。宜利溼燥經湯

苡仁 木瓜 防己 桂枝 甘草

# 虫 蠱

蟲因風化變而生。仲景分經屬厥陰。千古醫師工殺毒。祇原來歷欠分明。

吐蟲蟲痛。但見舌起白花者。皆風木所生也。宜仲景烏梅丸

當歸 黨參 桂枝 花椒 黃柏

烏梅 乾薑 附子 細辛 黃連

口内生蟲。以及二陰生蟲者。古名狐惑病也。宜新製化蟲丹。  
椒子 雄黃 枯礬 沿粉 烏梅 老連 甘草  
誤中蠱毒。食白礬而反甜者。邪變人臟氣也。宜經驗吐利湯。

升麻 鬱金

## 鬼祟

脈無定準。面無常。夜睡流涎。鬼祟傷。  
喻氏移精變氣說。鑿開荒徑。指津梁。

乍醒乍昏。寒熱面色無定者。鬼怪附人身也。宜移精變氣散。

虎骨 牡蠣 犀角 天麻 黃芪 桂尖

龍骨 羚羊 麝香 鹿角 人參 茯神



# 婦人調經

婦人經血屬於肝。肝血調和病自安。  
熱則參朮寒縮後腹疼瘀血定相干。

經水先期其血紫黑而多者血分中有熱也宜加味四物湯

生地 當歸 白芍 川芎 丹皮

枯芩 香附 柴胡 全皮 竹茹

經水後期其血淡白而少者血分中有寒也宜當歸和血湯

當歸 白芍 桂尖 細辛 艾葉 阿膠 甘草

生地 木通 香附 大棗 法夏 雲苓 生薑

經水過多以及漏下不止者衝任之虛崩也宜千金膠薑湯

生地 川芎 白芍 當歸 鹿霜 牡蠣

艾葉 阿膠 甘草 炮薑 附子 棕灰

經前腹痛。以及行經不利者。血分有餘滯也。宜加味香蘇飲。

當歸 白芍 陳皮 胡索 桃仁

香附 蘇梗 柴胡 丹皮 甘草

經後腹痛。以及經水減少者。血虛而不足也。宜加味補血湯。

黃芪 當歸 白朮 人參 香附 川芎 熟地

漏下白物。有如米飲不絕者。脾溼生帶證也。宜加味六君湯。

白朮 雲苓 半夏 菖蒲 澤瀉 烏藥 益智

前仁 甘草 陳皮 萼薢 豬苓 茵陳 防己

# 婦人安胎

安胎脾是大原頭。萬物生成土力優。腎主繫胞亦宜固。肝司胞血更當求。

胎中嘔吐。數次發惡不休者。脾胃氣阻滯也。宜香砂六君湯

方見胸前證

胎中心煩。兼見口渴頭暈者。心胃之虛火也。宜安胎清火湯

當歸 白芍 黃芩 白朮 沙參

澤瀉 知母 寸冬 雲苓 竹葉

胎中腰痛過甚。則恐墮胎者。帶脈之解弛也。宜加味固胎丸

杜仲 故紙 當歸 淮藥 續斷 白朮 人參

胎中腹痛甚亦能墮胎者。胎氣之不和也。宜調氣安胎。飲

當歸 白芍 厚朴 紫蘇 雲苓 生薑

胎胞下壓小便不得下出者。胞繫之不舉也。宜八味腎氣丸

熟地 桑皮 山藥 雲苓 澤瀉

安桂 附片 丹皮 寸冬 玉竹

胎胞上逼心中煩悶不安者。血虛而火迫也。宜養胃清降湯

人參 白朮 白芍 淮藥 當歸 阿膠

雲苓 寸冬 甘草 大棗 生地 桑仁

胎前水腫。以及腹中脹滿者。胞宮水不化也。宜加味防已湯。

防已 澤瀉 腹皮 薑皮 桔梗

苓皮 桑皮 杏仁 草梢 當歸

胎前欬嗽。以及噎嘔不安者。子咳與子噎也。宜調肺平肝湯。

桔梗 枳殼 杏仁 雲苓 前胡

當歸 生地 百合 寸冬 紫苑

## 保產

婦人新產莫言虛。恐是瘀停內阻持。若是瘀行商補劑。養陽不若養陰宜。

將產之期。預備滑胎催生者。必調和氣血也。宜保產無憂散。

當歸 川芎 白芍 黃芪 兔絲 厚朴 艾葉

芥穗 枳殼 貝母 羌活 甘草 生薑 綠豆

新產之初。腹痛暈煩等證者。瘀血相攻衝也。宜加味失笑散。

當歸 川芎 靈脂 蒲黃 童便

產後瘀盡。諸虛百損並見者。氣血大虧損也。宜十全大補湯。

生地 白芍 川芎 黨參 白朮

雲苓 當歸 甘草 安桂 黃芪

# 小兒

小兒外證求太陽三字方中明訓彰。究與大人同治法。不須科別擅偏長。

小兒發熱兼見惡寒頭痛者。太陽經傷寒也。宜人參敗毒散。

方見頭證

小兒口噤手足抽掣痰潮者。傷風動痰火也。宜羌活息風湯。

羌活 南星 竹瀝 半夏 生地 防風 薑豉

天麻 薑汁 枯芩 甘草 枳殼 犀角 羚羊

小兒內證

小兒內證求太陰脩園有語特丁甯集中所列無他證他證皆當即此尋

初生小兒屈腰噤叫不休者。瘀血積腹內也。宜用下瘀湯方

桃仁 靈脂 大黃

小兒腹痛。以及脹滿吐瀉者。總責太陰經也。宜香砂六君湯  
方見胸前證

小兒食積。手足熱。腹中痛者。脾胃不運化也。宜加減平胃散  
蒼朮 陳皮 厚朴 甘草 神麴

麥牙 山查 老連 生薑 白芍

小兒黃瘦。以及腹大潮熱者。脾胃之疳疾也。宜己疳胡連湯  
枳殼 山查 麥牙 蕪荑 胡黃連

白芍 生薑 甘草 腹毛 竹柴胡

此書不無脫畧。如婦人經產。小兒痘麻。以及瘡傷諸門。



皆未詳悉。然此為不知醫者。指陳大槩於此。既得指歸。一切方書。自不迷眩。且病無定情。證多兼見。守抹待免。未免膠粘。變化會通。一偶三反。見月忘指。則近道矣。

容川氏再跋